

Chronisch obstructief longlijden

CHRONISCH OBSTRUCTIEF LONGLIJDEN

Image not found

<https://www.medicsformedics.nl/%3A//resize/cronisch-303x120.gif>

Active Image

Image not found

<https://www.medicsformedics.nl/%3A//resize/bluebloather-218x232.jpg>

Active Image

1. ONDER DE TERM CHRONISCH OBSTRUCTIEF LONGLIJDEN WORDEN MEERDERE AANDOENINGEN SAMENGEBRACHT:

- * emfyseen:
 - alveolaire destructie
 - ontstaan grote gaten
- * chronische bronchitis:
 - inflammatie luchtwegen
 - geen alveolaire destructie
- * reactieve ademhalingsziekten:
 - bronchospasmen
 - mucuspluggen
 - mucosaal oedeem
- > veroorzaken:
 - obstructie grote luchtwegen
 - verminderde ventilatie

2. INCIDENTIE

USA 15%

3. PROGNOSE

- > naargelang graag van progressie
 - weinig gevorderd:
 - * patiënt stopt roken -> goede prognose
 - eindstadium:
 - * slechte prognose
 - * bedlegerig

4. OORZAKELIJKE FACTOREN

- roken = voornaamste oorzaak
- longziekten
- luchtvervuiling
- alfa 1 antitrypsine deficiëntie

1. Kliniek

- dyspnee
- tonthorax
- hoest
- wheezing
- retracties
- kleine ratio: inspiratie
expiratie
- cyanose
- orthopnee
- perifeer oedeem
- opzetting halsvenen
- S3 en S4 gallop

2. Diagnose

- anamnese
- lichamelijk onderzoek
- pulse oximetrie
- lab: bloedgasen
- RX thorax:
 - > pneumothorax
 - > atelectase
 - > pneumonie
 - > congestief hartfalen
- spirometrie: gouden standaard
- echocardio: om linker ventrikelfalen uit te sluiten

3. differentiaaldiagnose

- pneumothorax
- chronisch hartfalen
- pneumonie
- longembolen
- bovenste luchtwegobstructie
- restrictieve longziekte

4. Therapie

1. ZUURSTOF

- bij eerste opvang: begin eventueel (enkel indien strikt nodig) tijdelijk 100% O2
- let op voor CO2 narcose:
 - > afbouwen O2 tot saturatie 92%
 - > monitor patiënt goed
 - > komt voor bij eindstandige COPD/ blue bloaters

2. BRONCHODILATATIE

- aerosols
- zo nodig subcutaan

3. STEROIDEN

- methylprednisolone IV: 125 mg IV
- prednisone PO: 4 mg/d PO gedurende 5 dagen

4. ANTIBIOTICA:

- controversieel

5. BEADEMING

- niet invasief = CPAP:
 - > niet bij pneumonie
 - > kan intubatie voorkomen
- intubatie:
 - > voldoende traag beademen
 - > expiratie maximaal
 - > vermijden air trapping/ barotrauma

Voeg een nieuwe reactie toe

[Login](#) [1] of [registreer](#) [2] om te kunnen reageren

Bron-URL: <https://www.medicsformedics.nl/nl/chronisch-obstructief-longlijden>

Links

[1] <https://www.medicsformedics.nl/nl/user/login?destination=node/%23comment-form>

[2] <https://www.medicsformedics.nl/nl/user/register?destination=node/%23comment-form>