

Geïrriteerd kind

Geïrriteerd kind

Een geïrriteerd kind is vaak een reden tot consultatie op de spoedgevallendienst.

Het komt frequenter voor bij jonge ouders en bij een eerste kind.

Vaak is het voor de ouders moeilijk om in te schatten wat de oorzaak van de irritatie is. Dit creëert onzekerheid en angst.

Een systematische ondervraging van de ouders over het eet-, slaap- en huilgedrag, gecombineerd met een grondig klinisch onderzoek is vaak voldoende om de oorzaak te achterhalen.

Het kennen van de meest voorkomende mechanismen is een grote hulp voor de spoedarts.

1. Kliniek

Volgende punten zijn belangrijk in de klinische evaluatie:

GEDRAG

- Graad van irritabiliteit
- Lethargisch
- bewustzijnsverandering

VITALE TEKENS

- Koorts
- Oximetrie
- Pols
- Ademhalingsfrequentie
- Bloeddruk

DE HUID

- Cyanose: Wijst op hypoxie
- Purpura
- Petechiën
- Rash

VOEDINGS-EN STOELGANGSPATROON

- Diarree
- Braken
- Constipatie

TOXIDROOM

Aard vh huilgedrag

Vraag de volgende zaken systematisch na:

START VAN HET HUILEN

- Plotseling
- Sporadisch
- Progressief

DUUR

INTENSITEIT

TYPE HUILGEDRAG

- Schreeuwen
- Kreunen
- Zeuren
- Zeer intens

FACTOREN DIE HET HUILEN ERGER MAKEN

- Tijdens defecatie
- Tijdens ophouden van stoelgang
- Tijdens het voeden

Mechanismen

ELK KIND HEEFT DAGELIJKS IRRITATIEPERIODE(N)

Meestal is dit 's avonds

OP DE LEEFTIJD VAN ZES WEKEN HUILEN ZE NOG DAGELIJKS

Een uur lang

tot 4 uren per dag

IRRITATIE KAN MEN ZIEN DOORDAT HET (HUIL)GEDRAG ANDERS IS DAN ANDERS

DE MEEST FREQUENTE OORZAAK IS KOLIEKPIJNEN

Komt voor bij 25% van de gezonde kinderen

De periode ervoor kenmerkt zich door:

optrekken van de knieën

maken van stoelgang

De leeftijd waarop de kolieken het meest frequent voorkomen is

vanaf 2 tot 3 weken oud

het duurt ongeveer 12 weken lang

Koliekpijnen zijn de exclusiediagnose

2. Oorzaken

**DE MEEST FREQUENTE OORZAKEN BIJ
EEN CONSULTATIE VAN EEN ARTS VOOR
EEN GEIRRITEERD KIND ZIJN:**

- Koliekpijnen
- Angst van de ouders
- Doorbreken van de tanden
- Constipatie
- Luierirritatie

INFECTIES ALS REDEN VOOR IRRITATIE

◦ MINEURE ACUTE INFECTIES

- Bovenste luchtweginfectie
- Otitis Media

- Thrush
- Gingivostomatitis
- URINEWEGINFECTIE
- MENINGITIS
- OSTEOMYELITIS
- PNEUMONIE
- GASTRO-ENTERITIS

GASTRO-INTESTINALE OORZAKEN VAN IRRITATIE

- REFLUX (OESOFAGITIS)
- EEN INGEKLEMDE BREUK
- INTUSSEPTIE
- EEN ANALE FISSUUR

TRAUMATISCHE OORZAKEN VAN IRRITATIE

- VREEMD LICHAAM INGESLIKT OF GEINHALEERD
- FRACTUUR
- AFKNELLEN VAN EEN VINGER OF VAN DE PENIS

Meestal door haar dat errond is gedraaid

- EEN INTRACRANIEEL HEMATOOM

Subduraal

Epiduraal

- OOGLETSEL MET CORNEALE ABRASIE
- KINDERMISHANDELING
- EEN SPLINTER

MEDICATIE ALS OORZAAK VAN IRRITATIE

- VACCINATIEREACTIE
- NIEUWE MEDICATIE
- THUISREMEDIES
- VITAMINEGEBRUIK (risico op overdosering)

DEFICIENTIE ALS OORZAAK VAN IRRITATIE

- ONDERVOEDING
- YZERTEKORT (anemie)

CARDIOPULMONALE OORZAKEN VAN IRRITATIE

- SUPRAVENTRICULAIRE TACHYCARDIE
- CONGESTIEF HARTFALEN

- HYPOXIE

TORSIO TESTIS

ENDOCRIEN / METABOOL

- Bijvoorbeeld hypoglycemie

VASCULAIRE OORZAKEN

SIKKELCEL CRISIS

3. Diagnose workup

ANAMNESE

Voedingspatroon
Huilpatroon
Slaappatroon
Geboorte vlot? stuitligging? prematuriteit?

KLINISCH ONDERZOEK

Volledig ontkleden van het kind is belangrijk
Tekens van dehydratatie aanwezig?
Verlengde capillaire refill > 2 seconden
Droge mucosa
Kolieken?
Angstige ouders?
Doorbreken van de tanden?
Constipatie?
Luierirritatie?

LABORATORIUMTESTEN

Veneuse bloedname
complet (CBC)
Chemie
Urine
Bloedglucose vingerprik
Culturen op indicatie (bloed, urine, stoelgang)

TECHNISCHE ONDERZOEKEN

Op indicatie
RX thorax, ledematen
ECG
Stoelgangsstaal testen op bloed
Radiografie met bariumpap
Oogonderzoek met fluoresceïne

4. Behandeling

EERSTE OPVANG

ABC: vrije luchtweg, ademhaling, circulatie
Onmiddellijk verlossen van haartourniquet of splinter

OP SPOEDDIENST

Bij Kolieken

Kalmerende activiteiten (stressreductie)

Geen stimulerende middelen (Cola, Koffie)

Beperk slapen overdag

OPNAMEKRITERIA BIJ EEN GEIRRITEERD KIND

Een mogelijke levensgevaarlijke onderliggende oorzaak

Duidelijke stress bij de ouders door het kind

Voeg een nieuwe reactie toe

[Login](#) [1] of [registreer](#) [2] om te kunnen reageren

Bron-URL: <https://medics4medics.com/nl/ge%C3%AFrriteerd-kind>

Links

[1] <https://medics4medics.com/nl/user/login?destination=node/%23comment-form>

[2] <https://medics4medics.com/nl/user/register?destination=node/%23comment-form>