

Pre-eclampsie

Ernstige preeclampsie

- ontstaat vanaf 20 weken zwangerschap
- BDS \geq 160 of BDD \geq 110 mmHg
- proteinurie
- oedemen
- oligurie
- orgaandysfunctie
- hoofdpijn
- IUGR

Eclampsie = preeclampsie met gegeneraliseerde stuipaanvallen

Behandeling bij pre-eclampsie?

- ziekenhuisopname
- zuurstoftoediening
- profylaxe van stuipen: magnesiumsulfaat (IV of IM)
- bloeddrukcontrole
 - doel = BDD 90-100 mmHg
- hydralazine
- labetalol
 - voorkom te plotse bloeddrukdaling
- maternale monitoring
 - Ademfrequentie
 - reflexen
 - urinaire output
 - bewustzijn
- fetale monitoring
- dringend verloskundig advies en vooral een dringende bevalling

CASUSOMSCHRIJVING ERNSTIGE PREECLAMPSIE

vrouw, 25j
34 weken zwanger
BD 180/110 mmHg
SpO2 90% bij omgevingslucht
ernstige dyspnee
longoedeem op thoraxfoto
reeds 2 uren anurie
proteinurie ++++
Hb 11 g/dL
plaatjes 170 000/mm³
normale leverfuncties

Voeg een nieuwe reactie toe

[Login](#) [1] of [registreer](#) [2] om te kunnen reageren

Bron-URL: <https://www.medics4medics.net/nl/pre-eclampsie>

Links

[1] <https://www.medics4medics.net/nl/user/login?destination=node/%23comment-form>

[2] <https://www.medics4medics.net/nl/user/register?destination=node/%23comment-form>