

# Mallet vinger

## INDELING:

- strekpeesletsel
- ossaal: avulsie fractuur
- ossaal: avulsie fractuur >1/2 gewrichtoppervlak, waardoor instabiliteit van de P3 met dislocatie door tractie van de buigpees van de P3 naar volair

## THERAPIE:

### conservatief:

- strekpeesletsel en ossale mallet: Mallet spalk

### operatief:

- ossaal letsel met luxatie in DIP: percutane snaarfixatie P3-DIP-P2 vanuit de top van de vinger, Mallet spalk

## NABEHANDELING:

- Mallet spalk voor 4 (ossaal) tot 6 (tendinogeen) weken, bij risico activiteiten tot 9 weken

Let op: De spalk mag NIET worden afgenomen door de patient, anders is de behandeling voor niets geweest!

## CONTROLE:

### klinisch:

- 1 (afname zwelling), 4-6 en 9 weken

### radiologisch:

- alleen bij operatieve behandeling na 4 weken na verwijdering OS materiaal

## COMPLICATIES:

- blijvende extensiebeperking

## VERWIJDEREN OS MATERIAAL:

- na 4 weken (poliklinisch)

## Voeg een nieuwe reactie toe

[Login](#) [1] of [registreer](#) [2] om te kunnen reageren

---

**Bron-URL:** <https://medics4medics.nl/nl/traumatologie/distorsies/mallet-vinger>

## Links

[1] <https://medics4medics.nl/nl/user/login?destination=node/%23comment-form>

[2] <https://medics4medics.nl/nl/user/register?destination=node/%23comment-form>