

# Been: patellafracturen

## **FRACTUURINDELING:**

- intacte strekfunctie
- opgeheven strekfunctie
- mate van comminutie

## **THERAPIE:**

conservatief:

- bij intacte strekfunctie loopkoker

operatief:

- bij niet comminutieve fractuur: repositie en Zuggurtungsosteosynthese (2mm K-snaren, cerclagedraad 1,6 mm; oefenstabiel)
- bij comminutieve fracturen, waarbij reconstructie niet mogelijk is: partiele resectie patella (grootste fragment in situ laten), hechten strekapparaat en ontlastende cerclage tussen tuberositas tibiae en rest van de patella (oefenstabiel)
  - bij CX letten op hoog- of laagstand patella!

## **NABEHANDELING:**

conservatief:

- 6 weken loopkoker

operatief:

- onbelast 6 weken
- indien onbelaste mobilisatie niet mogelijk is, combinatie met loopkoker

## **CONTROLE:**

klinisch: 2, 6 en 10 weken

radiologisch: 6 weken

## **VERWIJDEREN OS MATERIAAL:**

- na 6 maanden (vaak klachten van uitstekende K-snaren)

## Voeg een nieuwe reactie toe

[Login](#) [1] of [registreer](#) [2] om te kunnen reageren

---

**Bron-URL:** <https://medics4medics.eu/nl/traumatologie/fracturen/been-patellafracturen>

## **Links**

[1] <https://medics4medics.eu/nl/user/login?destination=node/%23comment-form>

[2] <https://medics4medics.eu/nl/user/register?destination=node/%23comment-form>