

Been: pilon tibiale fracturen

Onderbeen: pilon tibiale fractuur

FRACTUURINDELING:

- indeling volgens AO
- A1 extra-articulair éénvoudig
- A2 extra-articulair met vlinderfragment
- A3 extra-articulair comminutief
- B1 partieel articulaire fractuur, splijting, éénvoudig
- B2 partieel articulaire fractuur, splijting + impressie
- B3 partieel articulaire fractuur, comminutieve impressie
- C1 complete articulaire fractuur (T-Y), éénvoudig
- C2 complete articulaire fractuur, metaphysair comminutief
- C3 complete articulaire fractuur, articulaire en metaphysair comminutief

THERAPIE:

conservatief:

- bij ernstige comminutie of weken delen letsel kan een conservatieve behandeling met calcaneus-snaartractie en gipsimmobilisatie overwogen worden.

operatief:

- bloedige repositie, plaat osteosynthese, spongiosaplastiek primair (oefen-stabiel)
- fixateur externe (orthofix) indien geen oefenstabiliteit bereikt kan worden, of bij ernstig gecompliceerde letsels

NABEHANDELING:

- onbelaste mobilisatie gedurende 12 weken

CONTROLE:

klinisch:

- 2, 4, 8, 12 en 14 en 20 weken

radiologisch:

- 2, 8 en 12 weken

COMPLICATIES:

- arthrose enkelgewricht

VERWIJDEREN OS MATERIAAL:

- na 1 jaar

Voeg een nieuwe reactie toe

[Login](#) [1] of [registreer](#) [2] om te kunnen reageren

Bron-URL: <https://www.medicsformedics.eu/nl/traumatologie/fracturen/been-pilon-tibiale-fracturen>

Links

[1] <https://www.medicsformedics.eu/nl/user/login?destination=node/%23comment-form>

[2] <https://www.medicsformedics.eu/nl/user/register?destination=node/%23comment-form>